

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ И СООБЩАТЬ О ПОБОЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ COVID-19

Медицинские работники играют ключевую роль в обеспечении постоянной безопасности вакцин против COVID-19

ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ

ШАГ 1



СПРОСИТЕ

была ли когда-нибудь у вакцинируемого человека острая аллергическая реакция на вакцины

Если ДА, перенаправьте человека к аллергологу или другому медицинскому специалисту, который порекомендует дальнейшие действия

ШАГ 2



ОЦЕНИТЕ

состояние здоровья вакцинируемого, соберите анамнез, учитывая наличие на период вакцинации острых и обострение хронических заболеваний, иммунных состояний, тяжелой аллергии на компоненты вакцины и получение иммуносупрессивной терапии.

ШАГ 3



СООБЩИТЕ

о любых побочных проявлениях после вакцинации, которые указывают на то, что организм человека выстраивает защиту от COVID-19

Возможные побочные проявления включают:

- Боль в руке
- Небольшое повышение температуры
- Усталость
- Головную боль
- Боль в мышцах или суставах

ШАГ 4

ПРОВОДИТЕ ВАКЦИНАЦИЮ



ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ

ШАГ 5



НАБЛЮДАЙТЕ

за вакцинированным человеком в течение 15 минут.

Наблюдайте в течение 30 минут за лицами, у которых в прошлом была аллергическая реакция на вакцину.

ШАГ 6



ПРОИНФОРМИРУЙТЕ

незамедлительно вашего руководителя о **любых неожиданных неблагоприятных** реакциях, выявленных при наблюдении или о тех, о которых было сообщено позже.

Заполните электронную или бумажную форму по побочным проявлениям после иммунизации (ПППИ), согласно приказу МЗ КР №110 от 15.02.2017г. «Руководство по эпиднадзору за ПППИ». После этого, органы здравоохранения займутся расследованием этого случая

В очень редких случаях, побочные реакции могут быть вызваны непосредственно вакцинами. Однако, сообщение о неожиданных побочных проявлениях и их расследование обеспечит, чтобы вакцины против COVID-19 продолжали и дальше соответствовать высоким стандартам качества.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ



Попригетстугейте. Улыбайтесъ. Игспользугейте уважителъный стйль общегия, внимателъно слушайте и задавайте вопросы. Установите хорошй зрительный контакт. Говорите уверенным и спокойным голосом. Это поможет установить хорошй контакт и получить доверие со стороны пациента к вашим рекомендациям о вакцинации.

Игспользугейте руководящий стйль: «Вам надо получить прививку» или «Молодцы, что вы пришли, сейчас будем делать прививку». Игспользование этого стйля доказало свою эффектйвность в работе с пациентами.



Оцените отношение
пациента
к вакцинации

Если на ваше предложение получить прививку пациент отвечает: «Хорошо, я готов», или «Хорошо, наверное, я буду прививаться» и не задают других вопросов, переходите на **Вставку «Согласие на вакцинацию»**.

Если на ваше предложение получить прививку пациент отвечает: «Я подумаю насчет прививки», «У меня есть сомнения и страхи по поводу вакцинации», переходите на **Вставку «Сомнения в вакцинации»**.

Если на ваше предложение получить прививку пациент отказывается от вакцинации, переходите на **Вставку «Отказ от вакцинации»**.



**Согласие
на вакцинацию**

Похвалите пациента. Информируйте пациента о прививке, которую необходимо получить и возможных проявлениях после вакцинации. Направьте на вакцинацию.



**Сомнения
в вакцинации**

Определите причины сомнения в вакцинации. Активно слушайте и отвечайте на вопросы. Расскажите о вакцинации. Предоставьте информацию о преимуществах вакцинации. При необходимости определите источники дезинформации, которые оказывают негативное влияние на попытки убедить сделать прививку. Укажите достоверные источники информации о вакцинации.

Игспользугейте **подход настоятельных рекомендаций**:


- Подтвердите, что вы понимаете опасения или сомнения по поводу вакцинации.
- Расскажите о своем положительном опыте по вопросам иммунизации или «Я тоже вакцинировалась».
- Приведите научные данные о вакцинации.
- Дайте объяснение своим рекомендациям.



**Отказ
от вакцинации**

Выслушайте с уважением причины отказа от вакцинации.

Признайте проблемы пациента и причины отказа от вакцинации. Объясните риски, связанные с отказом от вакцинации. Рекомендуйте вакцинацию или визит в любое другое удобное время и по любым другим вопросам, связанные с проблемами здоровья и дополнительной информацией по вопросам вакцинации.



ВАКЦИНАЦИЯ